

EL MINISTERIO SE COMPROMETE CON FENIN A SACAR EL DECRETO DE MÁRGENES ANTES DE FIN DE AÑO

Sanidad desbloqueará en 2011 la venta de nuevos productos sanitarios

→ La patronal de productos y tecnología sanitaria Fenin dice haber obtenido en una reunión con Sanidad el compromiso firme de que se publicará en breve

La patronal de fabricantes de productos y tecnología sanitaria Fenin se ha reunido con la ministra Trinidad Jiménez para buscar soluciones al impacto que sufrirá el sector por la rebaja de precios decretada para paliar el déficit público. El encuentro se ha saldado, se-

gún la patronal, con el compromiso firme del ministerio de sacar, "en un plazo muy breve de tiempo, que entendemos es a final de este año para que entre en vigor en 2011", el decreto de márgenes del sector, es decir, la norma que regulará los precios y el benefi-

cio sobre cada producto. La cuestión no es baladí: la ausencia de esta norma ha paralizado desde hace cuatro años la venta de nuevos productos sanitarios que, por el vacío legal, no han podido salir al mercado. Pese a este compromiso, Fenin no ha logrado so-

luciones al problema de la morosidad que afronta el sector, con una demora en el pago de casi 300 días. Sanidad dice que esta cuestión debe resolverse en la Conferencia de Presidentes, no en el Consejo Interterritorial ni en el ministerio.

luciones al problema de la morosidad que afronta el sector, con una demora en el pago de casi 300 días. Sanidad dice que esta cuestión debe resolverse en la Conferencia de Presidentes, no en el Consejo Interterritorial ni en el ministerio.

PÁG. 4

POLÉMICA POR EL PLAN DE ESPERANZA AGUIRRE

CESM tiene 300 representantes liberados en todo el SNS

La intención de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de recortar el número de liberados sindicales para ahorrar costes ha levantado mucha polvareda entre CESM y las centrales de clase. Los responsables sindicales coinciden en que una hipotética reducción de liberados (que varias regiones ya han comenzado a negociar) no puede hacerse de forma unilateral, y en que antes de adoptar esa medida habría que reducir cargos públicos y gastos oficiales innecesarios. Además, los sindi-

Los sindicatos sugieren que los recortes afecten primero a los cargos públicos

catos afirman que la cifra de liberados totales que manejan algunas regiones es muy superior a la real. En concreto, el presidente de CESM sitúa la suya en "300 en todo el SNS, si llega, y la mayoría compaginando tareas sindicales y laborales".

PÁG. 7

INDEMNIZACIÓN DE 200.000 EUROS

Castilla-La Mancha: el TSJ condena la insistencia en un tratamiento erróneo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Sescam a indemnizar con 200.000 euros al viudo y los hijos de una mujer que falleció por la complicación de una intoxicación alimenticia. La sentencia con-

dena por una mala práctica médica al no diagnosticarle el tromboembolismo pulmonar que padeció la fallecida e insistir en un tratamiento erróneo. El TSJ revoca el fallo de instancia que juzga inconsistente.

PÁG. 9

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 10]



El médico justifica los regalos que reciben, según un estudio.

Las prebendas de la industria, merecidas

El *Journal of the American Medical Association* publica hoy un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, en el que han participado 300 estudiantes de Medicina, con la siguiente conclusión: el 60 por ciento de los encuestados justificarían los regalos de la industria farmacéutica como pago al esfuerzo realizado en sus estudios. En España, la opinión es diferente.

Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor FIODOR DOSTOIEVSKY



Ferran Guedea, del Instituto Catalán de Oncología.

La prostatectomía en cáncer se asocia a peor calidad de vida

La cirugía radical en los pacientes con cáncer de próstata órgano-confinado se asocia con una mayor incidencia de incontinencia urinaria y disfunción sexual a los tres meses, según un trabajo dirigido por Ferran Guedea.

PÁG. 12

Un alelo de la calpaína 10 empeora el cáncer de laringe

Un equipo de otorrinolaringólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, ha determinado que el alelo UCSNP-63 de la calpaína 10 se asocia con un peor pronóstico en cáncer de laringe.

PÁG. 11

Desactivar el complejo NFkB, útil en leucemia linfoblástica aguda T

La desactivación del complejo proteico NFkB en las leucemias linfoblásticas agudas T podría tener un efecto curativo, según muestra un estudio en *Cancer Cell* del Instituto de Investigación del Mar, en Barcelona.

PÁG. 11

La neuroimagen ayuda a predecir el riesgo de padecer Parkinson

Un trabajo del Hospital Clínico de Barcelona, que se publica en *Lancet Neurology*, muestra que la neuroimagen identifica los trastornos de conducta durante el sueño REM, típico de personas con elevado riesgo de Parkinson.

PÁG. 13

Diagnóstico de los síndromes de amplificación del dolor

El diagnóstico precoz y diferencial es clave para el abordaje de los niños y adolescentes afectados por síndromes de amplificación del dolor, según ha puesto de manifiesto María Luz Gámir, del Hospital Ramón y Cajal.

PÁG. 16

NOVARTIS

Inspiración para innovar

ON

Onbrez® Breezhaler®

El único broncodilatador para el tratamiento de la EPOC¹ que, administrado 1 vez al día, proporciona:

- 24 horas de broncodilatación²
- Eficacia en 5 minutos^{3,4}



Una vez al día
onbrez®
breezhaler®
indacaterol polvo para inhalación

Ver ficha técnica en pág. 18

ONCOLOGÍA RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA RADIOTERAPIA EXTERNA Y LA BRAQUITERAPIA

La cirugía implica peor calidad de vida en cáncer de próstata

→ Uno de los principales estudios que se han presentado estos días en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (Estro)

demuestra que la prostatectomía se asocia a mayor riesgo de incontinencia urinaria y problemas sexuales a los tres años de seguimiento.

■ **Karla Islas Pieck** Barcelona
Los pacientes con cáncer de próstata órgano-confinado que son tratados con prostatectomía radical tienen una peor calidad de vida a los tres años que aquellos que reciben braquiterapia y radioterapia, según se desprende de los resultados de un estudio realizado por el Grupo Español Multicéntrico del Cáncer de Próstata Clínicamente Localizado, coordinado por Ferran Guedea, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Instituto Catalán de Oncología (ICO).

Las conclusiones de este trabajo, que ha sido presentado en Barcelona durante el XXIX Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (Estro), ponen de manifiesto que los pacientes que se han sometido a la cirugía radical tienen un mayor índice de incontinencia urinaria así como de problemas de la función sexual a los 3 años de seguimiento. El artículo ha sido aceptado para su publicación en la revista *Journal*



Ferran Guedea, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

of *Clinical Oncology*.

Ha detallado que un estudio previo ya había demostrado que la radioterapia y la braquiterapia se asociaban a una mejor calidad de vida de los pacientes en comparación con la prostatectomía a los dos años de seguimiento, por lo que estos datos representan la confirmación de

que los efectos se mantienen en el tiempo. Además, ha comentado que un nuevo estudio, aún inédito, amplía el análisis del seguimiento de estos pacientes a cinco años y, aunque no ha querido ahondar en las particularidades, ha adelantado que las conclusiones van en la misma dirección que los dos

anteriores.

Guedea, que actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y el presidente del comité local del congreso de la Estro, ha indicado a *DIARIO MÉDICO* que en la presente edición de esta reunión científica se presentan más de 1.900 comu-

MÁS PRECISIÓN Y SEGURIDAD

El Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha incorporado en su centro de Barcelona un acelerador lineal para el tratamiento de radioterapia de última tecnología. Se trata del segundo equipo de sus características que se instala en Europa -el otro está en Zúrich-, y el tercero en todo el mundo, después del que se inauguró la pasada primavera en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York (Estados Unidos). El *TrueBeam*, como se denomina este aparato, es más preciso y seguro que los anteriores y permite tratar tumores más pequeños o aquellos que están localizados en zonas sensibles del cuerpo. Además, permite hacerlo de forma más segura y con menos efectos secundarios para los pacientes. Con esta nueva generación de aceleradores lineales se puede, por ejemplo, tratar el cáncer de próstata evitando efectos como la incontinencia urinaria o la impotencia. "El paciente quiere curarse, pero no a cualquier precio, y valora cada vez más el disfrutar de una buena calidad de vida", ha dicho Ferran Guedea, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del ICO y presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

Los pacientes con cáncer de próstata que se han sometido a la cirugía radical presentan más incontinencia urinaria y disfunción sexual

El trabajo confirma los resultados que se habían obtenido a dos años. Un nuevo estudio, aún inédito, amplía el seguimiento hasta los cinco años

nicaciones de las cuales 50 corresponden a estudios randomizados, que en su gran mayoría son independientes, es decir, que no han sido promovidos por la industria farmacéutica.

Este año el congreso ha acogido a más de 5.500 participantes, principalmente de países europeos, entre los cuales constan más de

400 españoles.

Además, la reunión científica cuenta con cada vez más representación del resto de los continentes: este año se han inscrito casi un centenar de especialistas procedentes de países latinoamericanos, además de representantes de Norteamérica, Asia y de algunos países africanos.

SE CONFIRMA LA CARENCIA DE MEJORA


La QT postoperatoria en cáncer rectal no beneficia

■ **Karla Islas Pieck** Barcelona
Los beneficios de la quimioterapia postoperatoria con 5-fluorouracilo en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado que han recibido quimiorradioterapia preoperatoria no se han demostrado, según se desprende de los resultados de un estudio randomizado dirigido por Lucca Cionni, catedrático de Radioterapia en la Universidad de Pisa (Italia), que se ha presentado en el XXIX Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (Estro), que se celebra estos días en Barcelona.

El trabajo recoge datos de 655 pacientes de 11 centros de radioterapia italianos entre septiembre de 1993 y diciembre de 2003, tratados con el mismo esquema de quimiorradioterapia preoperatoria seguida de la cirugía

que fueron aleatoriamente separados entre el grupo de control y otro tratado con quimioterapia adyuvante postoperatoria mediante un régimen de seis ciclos de 5-fluorouracilo. Los resultados refuerzan las evidencias de la carencia de beneficios que supone este tratamiento postoperatorio.

Cionni ha explicado que la quimioterapia adyuvante postoperatoria está basada en la mejora en la supervivencia de los pacientes con respecto a aquellos sometidos a cirugía solamente, según las conclusiones de algunos ensayos antiguos, y en función de la evidencia adquirida en cáncer de colon, enfermedad para la cual se observa una mejora significativa de la supervivencia. No obstante, la necesidad de esta terapia no está claramente respaldada por nin-



Hans Kaanders y Lucca Cionni, en el congreso de la Estro.

Los resultados del trabajo italiano ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando otras modalidades de tratamiento adyuvante

gún ensayo clínico randomizado, por lo que puede resultar en un tratamiento potencialmente redundante en un gran número de casos.

A su juicio, estos resultados ponen de relieve la necesidad de seguir investi-

gando sobre otras modalidades de tratamiento adyuvante con el objetivo de reducir la alta incidencia de metástasis a distancia y también para mejorar el pronóstico de este tumor, que es muy frecuente.

EN LOS PACIENTES QUE PRESENTAN GANGLIOS

La terapia 'Arcon' mejora el control del tumor de laringe

■ **Karla Islas Pieck** Barcelona
La terapia *Arcon*, que consiste en la combinación de radioterapia acelerada con la respiración de carbógeno y la administración de nicotinamida, es eficaz para reducir la hipoxia crónica y aguda, por lo que mejora los resultados de control tumoral en el subgrupo de los pacientes con cáncer de laringe que presentan ganglios, según se desprende de los resultados de un ensayo aleatorizado en fase III que se ha presentado durante el XXIX Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica (Estro), que se celebra estos días en Barcelona.

El trabajo, que ha sido dirigido por Hans Kaanders, del departamento de Radio-

oncología del Centro Médico de la Universidad de Radboud, en Nimega (Holanda), ha comparado los resultados del tratamiento estándar con radioterapia acelerada con la terapia *Arcon* en 345 pacientes en estadios T2-T4 de cáncer laríngeo desde abril del 2001 hasta febrero del 2008.

Los investigadores han podido observar que los niveles de toxicidad eran iguales entre los dos brazos, mientras que en el grupo que recibió la terapia *Arcon* se alcanzó un control significativamente mayor del tumor.

Kaanders ha explicado que esta alternativa terapéutica, dado su mecanismo de acción, es más eficaz para controlar los tumores que presentan una alta proporción de células hipóxicas, por lo que determinar esta condición previamente puede ayudar a seleccionar mejor a los candidatos.