


La meitat de malalts de càncer de còlon sobreviuen

■ Un 45% dels pacients de l'hospital Josep Trueta de Girona amb metàstasi hepàtica continuen vius al cap de 5 anys ■ Aquesta xifra supera lleugerament la mitjana mundial, que és del 40%

Oriol Mas
GIRONA

L'hospital Josep Trueta de Girona té una taxa de supervivència al càncer de còlon amb metàstasi hepàtica superior a la mitjana mundial. El 45% dels pacients que han estat operats del fetge a causa d'una metàstasi provocada per un càncer de còlon sobreviuen al cap de cinc anys de la intervenció quirúrgica. Aquesta xifra representa un 5% més que la mitjana mundial de supervivència d'aquests pacients cinc anys després de l'operació, que se situa en un 40%. Aquesta serà una de les dades principals que aportarà el cirurgià Joan Figueras a una reunió internacional sobre el càncer de còlon i la manera de tractar-lo que s'està fent des d'ahir i fins avui a Roma. De fet, el doctor Figueras ha estat un dels dos experts escollits per representar l'Estat espanyol en aquesta trobada, juntament amb el doctor



Preparatiu per a una operació a l'hospital Josep Trueta de Girona ■ LLUÍS SERRAT

Joan Taberero, de l'hospital de la Vall d'Hebron, d'on és el cap d'oncologia mèdica. Els experts volen consensuar guies mundials per al tractament de la metàstasi hepàtica en el càncer de còlon, i la reunió ha de servir per posar en comú els millors tractaments possibles per als

Les xifres

50%

de pacients amb càncer de còlon acaben generant una metàstasi hepàtica, i només un 20% poden operar-se.

281

pacients són els que s'han operat d'aquesta malaltia al Trueta entre el 2005 i el 2010, amb 329 operacions.

La data

22-11-2011

és el dia que a l'hospital Trueta es farà una jornada internacional sobre tècniques noves de cirurgia hepàtica.

malalts, racionalitzar la despesa econòmica i homogeneïtzar la pràctica clínica.

281 pacients a Girona

L'hospital Josep Trueta ha tractat, entre el 2005 i el 2010, 281 pacients amb càncer de còlon que havien desenvolupat una metàstasi hepàtica. En total s'han fet 329 operacions, ja que 45 dels pacients se'ls ha hagut d'intervenir quirúrgicament dues vegades i en dotze casos s'ha hagut de fer en tres ocasions. El fet d'aconseguir que un 45% d'aquests pacients hagin sobreviscut en els cinc anys posteriors a l'operació es considera un resultat "molt bo" i s'atribueix a la bona feina de l'equip professional que s'encarrega d'aquests casos concrets.

Finalment, i segons les dades que va fer públiques ahir l'hospital Trueta, exactament la meitat dels pacients amb càncer de còlon acaben generant una metàstasi al fetge, i d'aquests només un 20% poden operar-se. El motiu és que aquests pacients havien estat operats abans del càncer de còlon, i el 64% havien rebut tractament de quimioteràpia abans de l'operació. A més, un 30% havien rebut també tractament amb anticossos monoclonals, un medicament biològic per reduir el tumor. ■

GAIREBÉ LA MEITAT ■ El càncer de còlon provoca metàstasi al fetge a la meitat dels pacients, dels quals només un 20% es poden operar. A l'hospital Trueta, un 45% dels usuaris que s'intervenien per aquesta patologia aconseguixen sobreviure al cap de cinc anys, una xifra un 5% superior a la mitjana mundial. El doctor Joan Figueras exposa els resultats en una trobada d'especialistes que se celebra avui a Roma.

El 45% d'usuaris del Trueta operats del fetge per un càncer de còlon sobreviuen 5 anys després

► L'èxit de les intervencions per metàstasi hepàtica que es fan a l'hospital gironí és superior a la mitjana mundial

GIRONA | F.B.

■ Gairebé la meitat dels usuaris de l'hospital Trueta que s'han operat del fetge per metàstasi provocada per un càncer de còlon aconseguixen sobreviure cinc anys després de la intervenció. Aquestes dades converteixen el centre sanitari gironí en un dels referents mundials en aquest camp, ja que la mitjana global de supervivència d'aquest tipus de pacients se situa al 40%. El cirurgià del Trueta Joan Figueras presenta aquests resultats en el marc d'una trobada internacional dedicada a parlar sobre aquest tema, que finalitza avui a Roma.

Del 2005 al 2010 a l'hospital Trueta s'han intervingut del fetge un total de 281 pacients que tenien càncer de còlon amb metàstasi hepàtica. En total, han suposat 329 operacions, ja que 45 pacients han estat intervinguts dos cops, i 12 en tres ocasions. Al cap de 5 anys, el 45% d'aquests pacients estan vius. Fonts de l'hospital asseguren que aquests resultats són molt bons fruit de la «bona tasca realitzada per tot l'equip que hi intervé».

La meitat de pacients amb càncer de còlon generen una metàstasi hepàtica, dels quals només el 20% poden operar-se. Cal tenir present que tots aquests pacients abans havien estat operats de càncer de còlon, i que el 64% havia rebut tractament de quimioteràpia abans de l'operació. El 30% també havia rebut tractament amb anticòs monoclonals (un medicament biològic per disminuir el tumor).

LA CLAU

CÀNCER DE CÒLON
Intervencions a 281 pacients que tenien metàstasi al fetge

■ Del 2005 al 2010, el Trueta ha intervingut del fetge un total de 281 pacients que tenien càncer de còlon amb metàstasi hepàtica. En total, han suposat 329 operacions en cinc anys.

La meitat de pacients amb càncer de còlon generen una metàstasi hepàtica, dels quals només el 20% s'operen

El càncer colonorectal és el més freqüent en la població si es consideren els dos sexes, i augmenta amb l'edat

El doctor Figueras presentarà aquesta informació durant la ponència que pronunciarà avui al matí a Roma. El doctor Figueras, juntament amb el cap d'oncologia mèdica de l'hospital de la Vall d'Hebron, Joan Taberner, han estat els experts escollits per representar l'Estat espanyol en aquesta reunió internacional, la qual té per objectiu consensuar guies mundials per al tractament de la metàstasi hepàtica en el càncer de còlon.

Per tal d'elaborar aquestes guies de consens, s'han reunit un o dos representants de cada país, els més experts en la matèria, per posar en comú quins són els millors



Un quiròfan de l'hospital Trueta.

tractaments possibles per als malalts, racionalitzar la despesa econòmica i homogeneïtzar la pràctica clínica. El doctor Taberner aportarà els seus coneixements des de la vessant de l'oncologia, mentre que el doctor Figueras tractarà la seva part quirúrgica.

D'altra banda, l'hospital Trueta acollirà el proper dia 22 de novembre un nou Workshop internacional sobre tècniques noves de cirurgia hepàtica, en la qual està previst que participin una setantena de metges.

El càncer colorectal és el més

freqüent en la població si es consideren els dos sexes. És el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó. La seva freqüència augmenta amb l'edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre dels 50 anys.

A la demarcació de Girona cada any es detecten 400 casos de càncer colonorectal, i és el segon tipus més mortal, després del de pulmó. En canvi, és un dels tumors malignes que més es beneficia de la detecció precoç.

Segons l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, els estudis demostren que l'eficàcia del tractament augmenta fins al 90% si es detecta de forma precoç. A banda de tenir hàbits saludables com portar una dieta equilibrada, evitar els hàbits tòxics, evitar l'obesitat i anar al metge davant qualsevol símptoma, els especialistes asseguren que és molt important tirar endavant el pla pilot de detecció precoç que ha de servir perquè en un termini de quatre anys els pacients majors de 50 anys puguin fer-se proves per descartar el càncer.