

## Es millora el circuit de detecció precoç de càncer de còlon

//EL 2004 Vilafranca va ser pionera en la prevenció amb la implantació d'un programa pilot

**Judit Benages**  
Vilafranca

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Per això els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n'augmenta les possibilitats de curació.

L'ICO va iniciar l'any 2000 i de forma pionera a tot l'Estat un Programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon i recte a l'Hospitalet. El 2004 es va fer una prova pilot a Vilafranca del Penedès i, posteriorment, el 2007, es va ampliar a tot l'Alt Penedès, sent la primera vegada que s'estenia a una zona rural. Actualment s'està realitzant la quarta ronda a Vilafranca i la tercera a la resta de la comarca.

### Milliores

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys d'edat i la prova de cribratge és molt senzilla.

S'ofereix la possibilitat de realitzar cada dos anys i de manera gratuïta una prova per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

En aquesta ronda s'ha incorporat el test immunològic a tota la població, més senzill de fer que el que s'utilitzava anteriorment (ara s'agafa una única mostra) més fàcil d'analitzar i quantificar i més sensible a l'hora de detectar lesions precancerigènes.

Les persones que ja han participat en l'anterior ronda rebran el material per fer la prova de detecció de sang oculta en femta per correu a casa seva. La resta, hauran d'anar amb la carta que s'envia del programa a la farmàcia que millor li convingui i allà li facilitaran tot el necessari un cop comprovades unes dades personals.


Un cop realitzada la prova, s'ha de portar a la farmàcia que millor li convingui tan aviat com li sigui possible.

Com sempre, el resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s'haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

Cal destacar que totes les farmàcies col·laboradores amb el programa tenen diferents distintius visibles.

### La importància de la detecció precoç

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el segon càncer més freqüent entre



Part del material que s'utilitza per fer la prova | 308

les dones i el tercer entre els homes, i s'estima que es diagnostiquen 4.000 casos nous a Catalunya cada any. És la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.000 anuals), i la immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys.

Si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar. El problema és que el càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir cap molèstia.

Possiblement, aquest és un dels millors exemples en què la detecció precoç, que permet el tractament en estadis inicials, modifica més positivament el pronòstic de la malaltia i redueix l'agressivitat terapèutica.