



RATIFICACIÓ BIOMÈDICA D'UNA SOSPITA

Els metges confirmen que el sexe oral pot causar càncer

● La presència del virus del papil·loma a la boca multiplica per 130 el risc de tumor

● La infecció vírica s'inicia als genitals d'homes i dones i arriba a la gola


ANGELS GALLARDO
BARCELONA

El virus del papil·loma humà (VPH), la infecció de transmissió sexual més freqüent a tot el món, potencialment cancerígena, s'ha allotjat històricament al coll de la matriu i a la vagina de les dones, i al penis i l'anus dels homes, on ha provocat diferents formes de càncer. La creixent detecció d'aquest virus en tots els racons de la cavitat oral, des de la gola fins a la llengua, ha motivat que es realitzessin diverses investigacions científiques que han confirmat que la pràctica de sexe oral, i la implícita transmissió bucal del VPH, subjau en fins al 35% dels càncers que afecten la boca i la gola.

La principal causa del càncer oral continua sent el consum de tabac i d'alcohol. No obstant, científics nord-americans ja van observar la dècada passada que, mentre als Estats Units i Europa baixaven les xifres de fumadors i bevedors, augmentava la detecció de tumors de boca i gola. Això va motivar nous estudis, que han trobat la vinculació d'aquests càncers amb el VPH i el seu contagi a través del sexe. «Aquest virus només pot arribar a la gola a través del sexe oral, no es pot adquirir per una altra via», va assegurar ahir l'epidemiòleg Xavier Castellsagué, de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), coautor de la investigació que confirma aquesta hipòtesi, publicada a la revista *Journal of the National Cancer Institute*.

TEST DETECTOR // L'estudi, en què han participat nou països, ha analitzat 1.500 malalts de càncer de cap i coll, i les dades que se'n han extret s'han contrastat amb les de 1.425 persones sanes. A tots ells se'ls va aplicar el test que detecta els anticossos del genotip 16 del VPH, una de les formes més agressives del virus, que es va trobar en el 35% dels malalts. «Tenir el VPH 16 a la cavitat oral multiplica per 130 el risc de patir un càncer en el futur», segons va assegurar Castellsagué.


El virus del papil·loma es manifest-



DANNY CAMINAL

►► L'epidemiòleg Xavier Castellsagué, de l'ICO, observa una gola afectada pel virus del papil·loma, ahir.

DESENVOLUPAMENT DEL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ



FRANCOINA CORTÉS

prevenció

PRESERVATIU I VIGILÀNCIA

● Totes les infeccions de transmissió sexual mantenen un increment constant a Catalunya des de fa més d'un decenni: des que existeixen teràpies —no curatives— contra el VIH, que causa la sida. Sifilis, gonorrea i clamídies, tres de les que més augmenten, sí que poden ser eliminades amb fàrmacs. Els metges insisteixen que s'utilitzi el preservatiu al practicar sexe amb parella no habitual. El VPH transmes per sexe oral té una difícil prevenció, però pot ser objecte de vigilància.

ta a través de més de 150 genotips diferents, 15 dels quals impliquen un alt risc de patir càncer.

El contagi del VPH afecta al llarg de la vida més del 80% de les dones sexualment actives de tot el món, i un nombre no determinat, però creixent, d'homes. La infecció la superen espontàniament un 90% dels infectats en els dos anys posteriors al contagi. Els homes, fins i tot abans. Quan sorgeix en forma de berruga genital difícil de curar, o causa lesions evidents, pot ser el preludi del desenvolupament d'un càncer. El VPH es pot allotjar també a la faringe, les amígdales, la base de la llengua, el paladar tou, la llengua i la mucosa interna de les galtes.

Totes les formes d'aquest virus lesionen la pell i les mucoses. Moltes berrugues de mans i peus tenen com a origen un contagi del genotip 1 del VPH, poc agressiu. Els genotips

6 i 11 subjauen en nombroses infeccions sexuals, i els 16 i 18 estan vinculats al càncer de coll de matriu, anus, vulva, penis i boca.

Encara que en els últims anys hi ha hagut discrepància científica sobre l'eventualitat que el VPH, que actua a partir del contacte directe, pugui ser la causa d'un càncer que sorgeix al fons de la boca, recentment ha predominat la posició dels que atribueixen aquest risc a la característica del teixit tou que recobreix l'interior de la boca.

La detecció del VPH forma part dels controls a què accedeixen nombroses dones, que es realitzen una anàlisi anual de les cèl·lules de la mucosa vaginal. La generalització d'aquesta prova ha reduït considerablement l'aparició de càncer de cervix. Aquesta anàlisi citològica està recomanada també a les dones vacunades contra el VPH. ■